

Przygotowanie do badania gastroscopowego (badanie w godzinach dopołudniowych) – SZPITAL Znieczulenie Ogólne!

Termin badania:	
Termin konsultacji anestezyjologicznej:	

Dzień przed badaniem

Wieczorem w dniu poprzedzającym badanie zjeść lekki posiłek bezmleczny, bez nabiałowy o godz.18.00, natomiast do 22.00 można pić.

Leki przyjmowane na stałe można w tym dniu (wcześnie rano) przyjąć popijając 1-2 łykami wody.

Osoby przyjmujące leki rozrzedzające krew, **po konsultacji z lekarzem prowadzącym** powinni je odstawić - 5 dni przed planowanym badaniem/zabiegiem, w przypadku nowych leków przeciwkrzepliwych (Xarelto, Pradaxa) powinni je odstawić 48h przed zabiegiem.

Aspiryna i pochodne (Acard, Polocard) – w przypadku zabiegów **diagnostycznych** w dniu badania należy nie przyjąć leku.

Zamianę leków przeciwkrzepliwych (w przypadku braku możliwości ich ostawienia) na podskórne heparyny drobnocząsteczkowe należy indywidualnie konsultować z **lekarzem prowadzącym!**

Po zakończeniu badania zalecana jest **dieta lekkostrawna**, odpowiednie nawodnienie, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jeśli pojawi się dyskomfort w postaci wzdęć, kurczowych dolegliwości bólowych brzucha, można zastosować środki typu **Espumisan, No-Spa**.

W przypadku pojawienia się **niepokojących objawów** tj. dolegliwości bólowych brzucha, wymiotów, krwawienia z należy niezwłocznie zgłosić się na **Izbę Przyjęć lub SOR** najbliższego szpitala.

Do badania należy zgłosić się ze: skierowaniem do SZPITALA na Oddział Chirurgii, dokumentem tożsamości, dokumentacją medyczną, szczególnie poprzednimi wynikami badań endoskopowych i histopatologii oraz aktualnymi wynikami badań krwi:

- grupa krwi
- morfologia
- APTT, INR
- elektrolity (Na, K)
- glukoza na czczo
- HBs lub dowód szczepienia p/wzw B
- EKG

W przypadku chorób tarczycy wymagane aktualne wyniki TSH, fT3, fT4 (3 miesiące).

Znieczulenie ogólne (dożylnie) polega na podaniu dożylnie środka usypiającego i przeciwbólowego. Jest to krótkie i płytkie znieczulenie na czas wykonania badania, nie wymaga założenia rurki intubacyjnej.

Konsultacja anestezyjologiczna – **7-10** dni przed zabiegiem z wypełnioną ankietą anestezyjologiczną i kompletem badań wyżej wymienionych! **Rejestracja do anestezyjologa w rejestracji głównej szpitala.**

Gdy badanie/zabieg endoskopowy jest wykonywane w znieczuleniu ogólnym, a wypis planowany jest na ten sam dzień, przy odbiorze pacjenta wymagana jest obecność **osoby towarzyszącej**.

Do badania w znieczuleniu ogólnym należy zgłosić się na **Izbę przyjęć o godz. ze skierowaniem do szpitala na Oddział Chirurgii!**

W dniu badania/zabiegu wykonywanego w znieczuleniu ogólnym **nie należy** prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn do dnia następnego.